



Pre-operatorio

- ✓ Complete el historial médico y el formulario de consentimiento antes de su cita. Esto permite a nuestros médicos revisar el historial médico antes de su cita e investigar más a fondo el historial médico de su hijo si es necesario.
- ✓ Siga las reglas preoperatorias con respecto a la comida y la bebida. No deje a su hijo comer ninguna comida por 6 horas antes de la cita y no deje a su hijo tomar agua por 3 horas antes de la cita. Un estómago vacío minimiza la posibilidad de que las partículas de los alimentos se aspiren a los pulmones, lo que resulta en una infección pulmonar.
- ✓ Si su hijo tiene tos o fiebre recientemente, llame a la oficina y considere reprogramar su cita.
- ✓ Su hijo debe llevar ropa cómoda y un Pull-up si lo necesita.

Inducción de Anestesia

La inducción de la anestesia general es el inicio de la anestesia. Existen varios métodos para iniciar la anestesia general. El tipo de inducción depende de factores varios del paciente: historia médica, nivel de cooperación y complejidad quirúrgica. Su anestesiólogo le sugerirá el método más apropiado de inducción. A los padres se les pedirá que vayan a la sala de espera inmediatamente después del período de inducción.

1. **Despierto - colocación del catéter y la inducción intravenosa:** Este método es el más apropiado para los pacientes moderadamente cooperativos que pueden sentarse quieto. Su anestesiólogo también puede sugerir este método si hay preocupación con las vías respiratorias del paciente; Un catéter IV permite la administración inmediata de agentes de reversión y medicamentos de emergencia.
2. **Inducción de máscara con anestesia por inhalación:** El gas de anestesia se administrará al paciente a través de una máscara de anestesia durante aproximadamente 1 minuto. A los padres se les pedirá que sostenga las manos de su hijo en caso de que se ponga nervioso y trate de quitarse la máscara. Se observarán cambios en el patrón de respiración y el ronquido. También se pueden observar movimientos involuntarios del cuerpo. Una línea intravenosa se colocará cuando su hijo esté dormido para administrar líquidos y medicamentos IV.
3. **Inducción intramuscular con medicamentos sedativos:** Le pediremos que mantenga a su hijo seguro en su regazo y sostenga sus manos mientras el médico inyecta los anestésicos en su brazo o muslo. Esto se hace muy rápidamente para minimizar la ansiedad y el miedo. Su cooperación es fundamental para permitir una inducción suave y segura. El sedante será efectivo en 5 minutos. El médico llevará a su hijo al cuarto operatorio para administrar oxígeno, colocar monitores de signos vitales y poner una línea intravenosa.

Su anestesiólogo y dentista se quedará con su hijo todo el tiempo para asegurar su comodidad y seguridad. Los signos vitales monitorizados durante este período incluyen: niveles de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el ritmo, la presión arterial y la ventilación.

Recuperación

El período típico de recuperación es de 30 a 60 minutos. Le pediremos que se quede con su hijo durante este período para que cuando su hijo despierte una cara familiar esté presente. Las marcas rosadas estarán presentes en el cuerpo de su niño debido a la cinta usada para proteger sus ojos, estabilizar la cabeza, y asegurar el tubo respiratorio, los monitores del corazón, y la línea IV. Estas marcas rosadas son temporales. Los moretones también pueden observarse por la colocación de IV. La hinchazón orofacial también puede estar presente secundaria debido al procedimiento dental.

Confusión, debilidad, cansancio, y mal humor son todos comportamientos normales exhibidos después de despertar de la anestesia. Visión borrosa, mareos y entumecimiento de la boca también puede ser experimentados. Estos efectos secundarios se resolverán con el tiempo. Una vez que llegue a casa es normal que su hijo duerma durante 2-3 horas. No deje que su hijo tome una siesta solo, debe haber alguien acompañándolo durante todo el tiempo. Cancelar todas las actividades por el resto del día. Manténgalo fresco y dentro de la casa por el resto del día.

Inicie la alimentación en su casa con líquidos claros (comience con paletas de hielo, puré de manzana, y gelatina). Una hora más tarde avance la dieta de su hijo a alimentos suaves y ligeros como sopa, galletas y pasta por el resto del día. Los productos lácteos deben evitarse durante las primeras 2 horas debido a su dificultad para digerir. Las náuseas y los vómitos pueden ocurrir durante el viaje en coche a casa o las primeras horas después de llegar a casa. Deben disminuir después de las primeras horas. Llame a su anestesiólogo si el vómito es persistente.

Tome medicamentos para el dolor según las indicaciones de su dentista y anestesiólogo.